

## Gebrauchsinformation

# BIOSERIN

Serumproteine vom Pferd mind. 60 mg / ml

Lösung zur oralen Eingabe für Tiere: Kaninchen, Kleinnager, Frettchen, Terrarientiere, Brieftauben, Ziervögel und Singvögel

### **Name und Anschrift des Zulassungsinhabers und, wenn unterschiedlich des Herstellers, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist:**

Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG,  
Siemensstraße 14, 30827 Garbsen

#### Hersteller:

Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG,  
Serumwerk Memsen, 27318 Hoyerhagen

### **Bezeichnung des Tierarzneimittels:**

Bioserin

Serumproteine vom Pferd mind. 60 mg / ml, Lösung zur oralen Eingabe für Tiere: Kaninchen, Kleinnager, Frettchen, Terrarientiere, Brieftauben, Ziervögel und Singvögel

### **Wirkstoff(e) und sonstige Bestandteile:**

1 ml enthält:

#### Wirkstoff:

Serumproteine vom Pferd: mind. 60 mg  
- ohne Konservierungsmittel -

### **Anwendungsgebiete:**

Bioserin steigert ganz allgemein die Abwehrkraft gegen Krankheiten. Es wird oral als diätetisches Nähr- und Kräftigungsmittel angewendet. Es dient zur Unterstützung der Behandlung bei:

Gastrointestinalen Störungen, Vergiftungserscheinungen, Stress, Ernährungsstörungen, Abmagerung infolge Krankheit, Entkräftung, allgemeiner Konditionsschwäche, Häutungsproblemen.

### **Gegenanzeigen:**

Nicht zur Zwangsfütterung von Landschildkröten mit Nierenerkrankungen geeignet. Nicht anwenden bei Kaninchen, die der Lieferung von Lebensmitteln dienen.

### **Nebenwirkungen:**

Keine bekannt.

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier/Ihren Tieren feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

### **Zieltierarten:**

Kaninchen, Kleinnager, Frettchen, Terrarientiere, Brieftauben, Ziervögel und Singvögel.

### **Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung:**

Richtdosis: 1 ml Bioserin pro kg Körpergewicht 3–4 mal

täglich. 1 ml entspricht 16 Tropfen (5 ml Tropfflasche). Bioserin sollte mindestens über einen Zeitraum von 5–7 Tagen verabreicht werden. Aufgrund seiner guten Verträglichkeit kann Bioserin bei Bedarf auch in deutlich größeren Mengen gegeben werden. Bioserin wird der Nahrung von Kleinnagern, Kaninchen, Frettchen, Terrarientieren sowie Zier- und Singvögeln zugesetzt oder direkt mit der Tropfflasche, einer Plastikspritze oder einem Löffel in das Maul oder den Schnabel des Tieres verabreicht. Bei vollständiger Inappetenz oder hochgradiger Gastroenteritis kann Bioserin 3–4 mal täglich über eine Magensonde zugeführt werden.

Tiere, welche die Futtermittelaufnahme verweigern, können über eine längere Zeit ausschließlich mit Bioserin versorgt werden.

### **Hinweise für die richtige Anwendung:**

Nach Anbruch sofort verbrauchen!

### **Besondere Lagerungshinweise:**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Kühl (2–8 °C) und lichtgeschützt lagern.

Nach Anbruch sofort verbrauchen!

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden.

### **Besondere Warnhinweise:**

Keine bekannt.

### **Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung von nicht verwendetem Arzneimittel oder von Abfallmaterialien, sofern erforderlich:**

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

### **Genehmigungsdatum der Packungsbeilage:**

Juni 2008

### **Weitere Angaben:**

#### Packungsgrößen:

10x5 ml, 100 ml